

# ไขข้อข้องใจการใช้ยา ในช่วงฉีดวัคซีนโควิด-19



ปัจจุบันมีคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ยาผ่านสื่อโซเชียลอย่างกว้างขวาง ประชาชนควรระมัดระวังและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปปฏิบัติตาม

## ยาแอสไพรีน หรือ เมบิแอสไพรีน

### ความเชื่อที่ผิด



แอสไพรีนป้องกันลิ่มเลือดที่เกิดจาก  
วัคซีนโควิด-19 ได้

### ข้อเท็จจริง



- แอสไพรีนไม่สามารถป้องกันลิ่มเลือดที่เกิดจาก  
วัคซีนโควิด-19
- การกินแอสไพรีนอย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้มี  
เลือดออกในอวัยวะสำคัญ จึงควรใช้ตามคำสั่ง  
แพทย์เท่านั้น

## คำแนะนำจากแพทย์

ผู้มีโรคประจำตัวสามารถใช้ยาตามแพทย์สั่งได้  
ตามปกติ อย่างดหรือเพิ่มยาด้วยตนเอง ทั้งก่อน  
และหลังการฉีดวัคซีน

