

สำรวจรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกัน

โรคคอตีบและบาดทะยัก แก่ประชาชน **ฟรี**

หากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 ท่านขึ้นไป

กระทรวงสาธารณสุข มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยักให้

ฟรี ณ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สนใจรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก

ลงชื่อได้ที่แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ หรือ โทร 652

ถึง...วันศุกร์ ที่ 12 มิ.ย. 58 เท่านั้น !!!



BEYOND COAL SUPPLY

COMPENSATION AND BENEFITS

AGE GROUP





โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัดเจลิบพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

โรคคอตีบ-บาดทะยัก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน



ฟรี



โรคคอตีบ เป็นโรคติดต่อเฉียบพลันติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการอักเสบและมีเนื้อตาย เป็นแผ่นหนาในคอหอยหรือหลอดลม ทำให้เกิดการตีบตันของทางเดินหายใจ ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะกลั้วบเนื้อหัวใจและเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ และทำให้เสียชีวิตได้

ทำไมต้องฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักในผู้ใหญ่ ?

โรคนี้อาจเกิดกับผู้ใหญ่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุก 10 ปี

ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

เพื่อ เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันโรคของผู้ใหญ่ ให้อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรคได้

คำแนะนำในการดูแลตนเองหลังฉีดวัคซีน ควรปฏิบัติดังนี้

- มีอาการไข้ ตัวร้อน ให้เช็ดตัวเพื่อลดไข้ ถ้าไข้ไม่ลดให้รับประทานยาพาราเซตามอล ทุก 4-6 ชั่วโมง จนกว่าไข้จะลด
- มีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบ กรณีเป็นไตแข็ง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบ (ผู้ที่ฉีดวัคซีนนี้บางราย อาจมีอาการบวมที่แขนบริเวณที่ฉีดมากกว่าปกติ คือ บวมลามไปถึงบริเวณหัวไหล่ ข้อศอกหรือทั่วทั้งแขน อาการดังกล่าวไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด เป็นอาการที่พบได้น้อย สามารถรักษาให้หายได้ไม่มีผลระยะยาว) หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

เช่น ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด และอาจมีไข้ได้ (อาการไข้มักเกิดภายใน 24 ชั่วโมง และหายไปภายใน 2-3 วัน)

"ด้วยความปรารถนาดีจาก
กองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร"




COMPENSATION AND BENEFITS





กระทรวงสาธารณสุข
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรค
คอตีบและบาดทะยัก แก่ประชาชน



**คอตีบโรคร้าย...
...ผู้ใหญ่ก็เป็นได้**
ร่วมรณรงค์ป้องกันด้วยวัคซีน



ขอเชิญผู้มีอายุ 20-50 ปี
เข้ารับการจัดวัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบ-บาดทะยัก
ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ใกล้บ้านท่าน

ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครบุรี 11000

DDC
1422
สายด่วนกรมควบคุมโรค

COMPENSATION AND BENEFITS

คำแนะนำในการดูแล
ภายหลังฉีดวัคซีน



วัคซีนที่ให้ในการรณรงค์ครั้งนี้ เป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยักอยู่ในเข็มเดียวกัน วัคซีนนี้ เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันโรคและความปลอดภัยอย่างไรก็ตาม ภายหลังได้รับวัคซีนแล้วท่านอาจจะมิใช่ ปวดบวมแดง ร้อนบริเวณที่ฉีด แต่ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง อาการที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อวัคซีน หากท่านมีอาการหลังฉีดวัคซีนเหล่านี้ ควรปฏิบัติดังนี้

ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด ในระยะ 24 ชั่วโมงแรก หลังฉีด หากมีอาการปวดมากให้ใช้น้ำเย็นประคบ และให้รับประทานยาแก้ปวดตามคำแนะนำของแพทย์ ผู้ที่ฉีดวัคซีนนี้บางราย อาจมีอาการบวมที่แขนบริเวณที่ฉีดมากกว่าปกติ คือ บวมลามไปถึงบริเวณหัวไหล่ ข้อศอกหรือทั่วทั้งแขน อาการเช่นนี้ เกิดจากการที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยักอยู่ในระดับสูง อาการดังกล่าวไม่มีอันตรายแต่อย่างใด เป็นอาการที่พบได้น้อย สามารถรักษาให้หายได้และไม่มีผลแทรกซ้อนระยะยาว

ไข้ที่เกิดขึ้น มักเป็นไข้ต่ำ ให้เช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดา โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ ข้อพับต่าง ๆ ควรเช็ดมาก ๆ เพื่อช่วยพาความร้อนออกจากร่างกายและอาจให้ยารับประทานลดไข้ ตามคำแนะนำของแพทย์ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพาไปพบแพทย์



BEYOND COAL SUPPLY

โรคคอตีบ

Diphtheria

โรคนี้เป็นอย่างไร ?

คอตีบเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งสามารถสร้างพิษที่ก่อให้เกิดการอักเสบและทำให้เนื้อเยื่อตายเป็นแผ่นหนาในลำคอหรือหลอดลมเกิดการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ชื่อว่า “โรคคอตีบ” บางรายต้องเจาะคอเพื่อเปิดช่องหายใจ



อาการเป็นอย่างไร ?

เริ่มต้นด้วยไข้ต่ำ ๆ มีอาการคล้ายหวัดในระยะแรกมีอาการไอแห้ง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ต่อมา มีแผ่นฝ้าสีขาวอมเทา ติดแน่นที่บริเวณทอนซิล ช่องคอ โพรงจมูก กล้องเสียง ในรายที่รุนแรงจะมีอาการตีบตันของทางเดินหายใจจนหายใจไม่ออกและเสียชีวิต



อาการแทรกซ้อนที่สำคัญคืออะไร ?


พิษของเชื้อคอตีบอาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบทำให้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงของกล้ามเนื้อตา แขนขา กระบังลม นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีโรคแทรกซ้อน อื่น ๆ เช่น ปอดอักเสบ ไตทำงานผิดปกติ

โรคนี้ติดต่อกันได้อย่างไร ?

เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคอยู่ในลำคอ ติดต่อกันได้จากการไอ จามรดกัน หรือพูดคุยในระยะใกล้ชิด เชื้อโรคจะเข้าสู่ผู้อื่นทางปากหรือทางการหายใจบางครั้งติดต่อโดยการใช้อาหารร่วมกัน เช่น แก้วน้ำช้อน หรือ การอมดูดของเล่นร่วมกันในเด็กเล็ก



โรคนี้เป็นเฉพาะในเด็กไม่ใช่หรือ ทำไมต้องให้วัคซีนในผู้ใหญ่ด้วย ?



โรคนี้เป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคในระยะที่ผ่านมาเคยมีการระบาดใหญ่ของโรคคอตีบในผู้ใหญ่ เนื่องจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 20-50 ปี มีระดับภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคคอตีบ

เพื่อเพิ่มระดับความคุ้มกันของผู้ใหญ่กลุ่มนี้ให้อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรคได้ในปี 2557

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เริ่มให้ฉีดวัคซีนทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558



BEYOND COAL
SUPPLY

COMPENSATION AND BENEFITS

AGE
GROUP